

فاکتورهای مؤثر بر افسردگی مرگ در مددجویان مبتلا به سرطان

امیرحسین گودرزیان^۱، سید حمید شریف نیا^۲، *اکبر شیخ رابری^۳، محمد طهماسبی^۴، کتانه فرخ منش^۵، محمدعلی سلیمانی^۶، نعیمه پوررمضانی^۷

۱- کارشناس پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

۲- استادیار پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی امل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

۳- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی سیرجان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول)
p.shykhraori@gmail.com

۴- کارشناس پرستاری، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

۵- کارشناس پرستاری، بیمارستان امام رضا (ع) امل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

۶- استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

۷- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی سیرجان، کرمان، ایران.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۵/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۴/۸

چکیده

مقدمه: زندگی با یک عامل تنش‌زای جدی مانند سرطان، به عنوان یک الگوی شناخته شده فعال مرتبط با مرگ و مردن شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع افسردگی مرگ و عوامل مرتبط با آن در مددجویان مبتلا به سرطان اجرا شد.

روش: در این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی که در سال ۱۳۹۴ (مهر تا اسفند) انجام شد، ۵۰۰ مددجو با تشخیص سرطان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. داده‌ها به کمک فرم مشخصات فردی و مقیاس افسردگی مرگ جمع‌آوری شدند. رگرسیون خطی تک و چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار SPSS ۲۲ جهت بررسی ارتباط عوامل بالقوه با افسردگی مرگ در بیماران سرطانی استفاده شدند. **یافته‌ها:** با توجه به نتایج مطالعه حاضر مشخص شد سن مردان (۹۵: ۴۶/۶۲-۵۰/۵۷؛ CI ۹۵: ۴۸/۵۹±۱۶/۱۵؛ $\beta = ۰/۰۰۲$) بیش از سن زنان (۹۵: ۴۴/۵۶-۴۸/۲۰؛ CI ۹۵: ۴۶/۳۸±۱۴/۲۴) می‌باشد. میانگین نمره افسردگی مرگ در بین بیماران، بالاتر از چارک سوم بود. آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که نمرات میزان درآمد ($\beta = ۰/۲۴$ ، $P < ۰/۰۰۱$)، عدم سابقه مصرف مواد مخدر ($\beta = ۰/۱۳$ ، $P = ۰/۰۰۲$) و مرحله سرطان ($\beta = ۰/۱۲$ ، $P = ۰/۰۰۵$) پیش‌بینی‌کننده‌های مستقلی برای افسردگی مرگ در بیماران سرطانی بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به فراوانی بالای افسردگی در بیماران تحت مطالعه، اهمیت توجه و تمرکز بیشتر بر ارزیابی‌ها و مداخلات روان‌شناختی در این دسته از بیماران به ویژه در مرحله‌ی فعال بیماری و دوره‌های شیمی‌درمانی پررنگ‌تر می‌شود.

کلید واژه‌ها: افسردگی مرگ، سرطان، عوامل مرتبط، بیمار.